MENTOR™



Pasientgaranti i særklasse

MENTOR™ Promise Pasientgaranti

En omfattende pasientgaranti fra Johnson & Johnson – en global leder innen helse med over 130 års erfaring[1]

KUN MED MENTOR™ BRYSTIMPLANTATER

Johnson&Johnson
MedTech

Mentor er opptatt av din langsiktige trygghet og velvære

Før operasjonen er vi her for å svare på dine spørsmål, og ikke minst er vi her for deg også etter inngrepet – med et langsiktig engasjement for din trygghet og livskvalitet.

Enten du ønsker å se bedre ut eller føle deg bedre, kan det gi en enestående trygghet å vite at kirurgen har valgt implantater av høy kvalitet – en beslutning du kan ha tillit til lenge etter operasjonen.



Som en av verdens ledende produsenter av høykvalitets silikon-gel brystimplantater i over 40 år, har vår erfaring resultert i produkter du kan stole på.[5,6]

40 years
MENTOR™
Behind All Breasts™

* Alle MENTOR™ brystimplantater gjennomgår en rekke grundige tester og kontroller for å sikre kvaliteten før de forlater produksjonen.

MENTOR™ Promise Pasientgaranti

MENTOR™ brystimplantater gjennomgår en rekke kontrollerte tester for å sikre at kun produkter som møter eller overstiger våre standarder forlater våre produksjonslokaler. Implantatene støttes av Johnson & Johnsons omfattende **MENTOR™ Promise pasientgaranti.** Johnson og Johnson er en global leder innen helse med over 130 års erfaring.[1]

Pasientgaranti oversikt[1]

Gratis og automatisk innmelding

Produktet **erstattes** ved rift/ruptur innenfor produktets levetid†‡

Opptil **€1000** i finansiell bistand ved rift/ruptur§||

Produktet **erstattes** ved kapselkontraktur (BakerIII/IV), dobbeltkapsling og seroma i senstadie¶#

Gratis kontralateralt imlantat dersom kirurgen din ber om det^

† Ved bekreftet ruptur eller deflasjon (lekkasje) i et MENTOR™-brystimplantat på grunn av slitasje eller delaminering som krever kirurgisk inngrep, vil Mentor, uavhengig av implantatets alder, tilby et nytt MENTOR™-brystimplantat, uansett størrelse i samme eller lignende type som det opprinnelig implanterte produktet..
‡ Gjelder alle MENTOR™ brystimplantater, fra desember 2022 (ved primær forstørrelse og rekonstruksjon).
§ Hvis det oppstår en bekreftet ruptur av et MENTOR™ gelfylte brystimplantater, og du trenger en ny operasjon eller fjerning uten nytt implantat innen ti år etter innsetting, kan du få økonomisk støtte fra Mentor – så lenge du oppfyller kravene og dette er bekreftet av Mentor. Mentor dekker da utgifter du selv må betale for operasjonssal, bedøvelse og kirurgiske kostnader knyttet til inngrepet, som ikke dekkes av forsikring, med inntil €1000 totalt. Utgifter til operasjonssal og bedøvelse prioriteres. For å få økonomisk støtte i henhold til Mentor Promise pasientgaranti, må du ta kontakt med kirurgen din. Støtten er ikke et lån.
|| Ved kapselkontraktur (Baker III/IV), dobbel kapsel eller senfase serom etter brystforstørrelse med MENTOR™ gelfylte brystimplantater, tilbyr Mentor gratis erstatningsimplantat i inntil ti år fra operasjonsdatoen – så lenge du oppfyller kravene, og dette er bekreftet av Mentor etter vurdering av implantatet og nødvendig dokumentasjon. Du får et nytt MENTOR™ implantat av samme eller lignende type og størrelse som det opprinnelige.
Gjelder ved kapselkontraktur (CC) av MENTOR™ gelfylte brystimplantater i 10 år fra og med mai 2013 / dobbel kapsel (DC) og serom i senstadie (LSS) fra og med juli 2017 (ved primær brystforstørrelse).
^ Gjelder alle MENTOR™ brystimplantater ved tilfeller av ruptur, CC, DC og LSS – fra juli 2017.

REFERANSER:

1. MENTORPROMISE PROTECTION PLAN FOR MENTOR™ BREAST IMPLANTS, Legal Document, 2025. **2.** Mentor GEL MIXING (1:1 or 3:1 Ratio). 09/30/2022. ADAPTIV Document #PROC400623; Mentor Product Performance Qualification Summary Report For Siltex Round Gel Mammary Devices With HTV Sprayed Shells. Data on file. **3.** Mentor Product Performance Qualification Summary Report For Smooth Round Gel Mammary Devices With HTV Sprayed Shells. Data on file. **4.** FDA Saline, Silicone Gel, and Alternative Breast Implants Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff. Available from www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/saline-silicone-gel-and-alternative-breast-implants [Accessed November 2025]. **5.** Bondurant S, Ernster V, Herdman R. Safety of Silicone Breast Implants. Washington DC: National Academy Press, 1999; Mentor Aesthetics Market Analysis Breast Implants. 11/10/2023. Data on file. **6.** Mentor Aesthetics Market Analysis Breast Implants. 11/10/2023. Data on file.

VIKTIG INFORMASJON:

MENTOR™ brystimplantater: MENTOR™ MemoryGel™, MENTOR™ CPG™ eller MENTOR™ saltvannsimplantater, er beregnet for brystrekonstruksjon og brystforstørrelse til personer som er fylt 18 år.

Brystimplantatkirurgi bør ikke utføres på personer:

• med aktiv infeksjon hvor som helst i kroppen

• med eksisterende kreft eller forstadier til kreft i bryst(ene) som ikke er tilstrekkelig behandlet

• som er gravide, eller ammer

Sikkerhet og effekt er ikke fastslått hos pasienter med autoimmune sykdommer (for eksempel lupus og sklerodermi), svekket immunforsvar, tilstander som påvirker sårtilheling og blodkoagulering, eller redusert blodtilførsel til brystvev. Pasienter med diagnoser som depresjon eller andre psykiske lidelser bør vente til disse tilstandene er behandlet eller stabilisert før de gjennomgår kirurgi med brystimplantater.

Det finnes risiko forbundet med brystimplantatkirurgi. Du bør være klar over at brystimplantater ikke er evigvarende, og at en brystoperasjon kan kreve flere inngrep over tid. Risikoen for komplikasjoner øker over tid Du kan få behov for flere, uplanlagte operasjoner av brystene på grunn av komplikasjoner eller kosmetiske resultater som ikke er tilfredsstillende. Mange av endringene som skjer i brystene etter implantasjon er irreversible (kan ikke reverseres), og brystimplantater kan påvirke evnen til å amme, enten ved å redusere eller eliminere melkeproduksjonen.

Brystimplantater er ikke evigvarende, og brystimplantasjon kan kreve mer enn én operasjon. De vanligste komplikasjonene ved brystforstørrelse med MemoryGel™-implantater er reoperasjon, kapselkontraktur, endringer i følsomhet i brystvorten og fjerning av implantatet med eller uten erstatning. De vanligste komplikasjonene med CPG™-brystimplantater ved brystforstørrelse er reoperasjon av ulike årsaker, fjerning av implantatet med eller uten erstatning, og ptose (hengende bryst). En mindre vanlig komplikasjon er ruptur. Helsekonsekvensene av et sprukket silikon-gel-brystimplantat er ikke fullt ut fastslått. MR-undersøkelser anbefales tre år etter den første implantasjonsoperasjonen og deretter hvert annet år for å oppdage «stille» ruptur. Brystimplantater er også forbundet med risikoen for brystimplantat-assosiert anaplastisk storcellet lymfom (BIA-ALCL), en uvanlig type lymfom. Basert på tilgjengelige data om forekomsten av tilfeller på verdensbasis, er risikoen for å utvikle BIA-ALCL med MENTOR™-brystimplantater svært lav.

Detaljert informasjon om risikoer og fordeler knyttet til MENTOR™ brystimplantater finner du på https://breastimplantsbymentor.net/safety/mentor-safety. Det er viktig å sette seg inn i risikoer og fordeler, før man tar et valg om å gjøre en brystrekonstruksjon/brystforstørrelse.

MENTOR™ CONTOUR PROFILE™ vevsekspandere for bryst brukes ved brystrekonstruksjon etter mastektomi, korreksjon av underutviklet bryst, arrkorreksjon og prosedyrer for vevsdefekter. Disse ekspanderne er ment for midlertidig subkutan eller submuskulær implantasjon; de skal brukes innenfor en tidsramme fastsatt av legen for å oppnå ønsket grad av vevsekspansjon.

MENTOR™ CONTOUR PROFILE™ vevsekspander skal ikke brukes på pasienter som allerede har implanterte enheter, som pacemakere, medikamentinfusjonssystemer, kunstige sensorenheter osv., som kan påvirkes av magnetfelt. Mentor har ikke testet effekten av strålebehandling sammen med MENTOR™ CONTOUR PROFILE™ ekspanderenheter. Forekomsten av utpressing (ekstrusjon) av ekspanderen har vist seg å øke når den plasseres i skadet vev: arrvev, sterkt bestrålt eller brent vev, knust benvev, områder hvor det tidligere er utført omfattende kirurgisk reduksjon, og der steroider brukes i det kirurgiske området. Detaljert informasjon om indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler ved bruk av MENTOR™ CONTOUR PROFILE™ ekspandere finnes i bruksanvisningen (IFU), tilgjengelig på www.mentorwwllc.eu

TDETTE ER EN BEGRENSET GARANTI, I HENHOLD TIL VILKÅRENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET. ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE – INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL – ER UTELUKKET, I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER LOKAL LOVGIVNING. MENTOR ER IKKE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE TAP ELLER FØLGESKADER, TAP ELLER KOSTNADER SOM OPPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE VED BRUK AV DISSE PRODUKTENE. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, PÅTAR IKKE MENTOR SEG – OG GIR HELLER IKKE ANDRE TILLATELSE TIL Å PÅTA SEG – YTTERLIGERE ANSVAR ELLER FORPLIKTELSER I FORBINDELSE MED DISSE PRODUKTENE. MENTOR GIR INGEN GARANTI OG PÅTAR SEG IKKE ANSVAR FOR MENTOR-PRODUKTER SOM IKKE ER ANSKAFFET DIREKTE FRA MENTOR AV DEN BEHANDLENDE LEGE (ELLER DERES AUTORISERTE LEVERANDØR.

© Johnson & Johnson og tilknyttede selskaper 2025.
M_EM_MNT_BRST_170485.4

Johnson&Johnson
MedTech